



## 1. Présentation du réseau 2019

Le réseau de piégeage de la *D. suzukii* est en place depuis mi-mai sur 11 parcelles : 4 parcelles de cerises, 2 de framboises et 5 parcelles multi-espèces comportant des cerisiers.

## 2. Captures sur le réseau

### a. Suivi des pièges du réseau

#### - *Cerises*

*La récolte de cerises est en cours.*

Seulement 2 pièges enregistrent de faibles captures, 1 femelle pour l'un et 3 mâles pour l'autre. Sur ces parcelles aucun dégât n'est observé.

Les conditions météo sont actuellement favorables avec de la fraîcheur et de l'humidité le matin et le soir. Il faut rester très vigilant pour ce ravageur.

**Les premiers dégâts ont été observés sur des cerises acides conduites en agriculture biologique ne faisant pas partie du réseau de piégeage. Les dégâts restent faibles pour le moment.**

#### - *Framboises*

*La récolte des framboises a débuté.*

Les captures sont faibles sur le réseau avec 1 seule femelle sur une parcelle. Pour le moment aucun dégât n'a été observé ou signalé.

#### - *Multi-espèces*

Les captures sont faibles sur le réseau. Pour le moment aucun dégât n'a été observé ou signalé.

### *C. Rappel des mesures prophylactiques*

Tout doit être fait pour éviter la pullulation de l'insecte dans les cultures. La mise en œuvre des mesures prophylactiques est de première importance dans le maintien des populations de *D.suzukii* à un faible niveau. Il est donc recommandé de :

- **Maintenir un enherbement bas et aéré, afin d'éviter l'humidité**
- **Récolter les fruits avant la sur-maturité** (ne pas trop espacer les récoltes et éliminer les fruits en sur-maturité)
- **Sortir les écarts de tri de la parcelle et les fruits tombés au sol.** Les éliminer de façon rigoureuse pour éviter toute contamination ou développement de la population. Il est par exemple conseillé de mettre les fruits écartés dans des sacs poubelles ou autres contenants fermés hermétiquement, ou encore dans une benne couverte d'une bâche de couleur foncée et laisser quelques jours au soleil (solarisation). Privilégier plusieurs petits contenants à un gros, attendre plusieurs jours avant de ré-ouvrir le contenant. Préférer une ouverture en conditions froides afin d'éviter la sortie des adultes.
- **Réfrigérer la récolte** le plus rapidement possible avec une température basse compatible avec la commercialisation des fruits. Raccourcir au maximum le délai de stockage.

